Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 3 DEL 14 APRILE 2017

CILIEGIO
PEDEMONTANA e BERICI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV aggiornato al 14/04 h 9.00

Vicenza e pedemontana	giovedì 13 pom/sera	venerdì 14 mattina	venerdì 14 pom/sera	sabato 15 mattina	sabato 15 pom/sera	domenica 16	lunedì 17
stato del cielo							
temperatura	max 22/24 °C	min 10/12 °C max 20/22 °C		min 9/11 °C max 16/18 °C			
precipitazioni	Assenti	Assenti	Generalmente assenti	Qualche pioggia anche a carattere di rovescio/temporale	Qualche pioggia anche a carattere di rovescio/temporale	Qualche pioggia nel pomeriggio/sera	Qualche pioggia nel pomeriggio/sera
probabilità precipitazioni	0%	0%	10%	40%	70%	30%	30%
attendibilità previsione		Buona	Buona	Discreta	Discreta	Discreta	Scarsa

Andamento meteo: Ultima settimana sostanzialmente stabile, soleggiata e asciutta. I moti temporaleschi di martedì u.s. hanno interessato solo la pedemontana ma non hanno prodotto pioggie (solo 1 mm). Le temperature sono risalite nuovamente al di sopra della norma di 3,5-4°C sui valori massimi e di 2-2,5°C su quelli minimi attestandosi sui 20-21°C e 9,5-11°C rispettivamente.

Stato fenologico e colturale: ovunque, escluso l'alta collina, è in corso la fase di scamiciatura-ingrossamento del frutto sulle varietà a fioritura precoce mentre le tardive sono ricomprese tra la caduta petali e l'allegagione. Progressione relativamente lenta in quest'ultima settimana. In tutti i settori, anche se in modo irregolare, c'è una evidente scalarità di fase su alcune varietà a maturazione precoce (Early bigi e Bigarreau burlat, soprattutto). Le prime impressioni sulle cariche produttive delle precoci sono buone (Early bigi, in particolare). In questi casi è necessario fornire da subito un adeguato supporto idrico e nutritivo (azoto e potassio per via radicale).

Stadio cv. Vera

Stadio cv. Ferrovia

Colonia di Afidi

Larva defoliatrice

Stato parassitario: **Monilia** – attualmente quasi assente per via delle sfavorevoli condizioni ambientali. **Afide nero** – incremento della presenza di focolai primari negli impianti non ancora trattati. **Insetti defogliatori** (falene-tortricidi) - occasionali e limitate presenze negli impianti vicini ad aree boscate.

Indirizzi di difesa: Sulle cv. tardive, appena completata la fase fiorale, è necessario eseguire il trattamento già indicato la scorsa settimana per le medio-precoci. Impiegare un aficida specifico (a base di *Azadiractina* o Pirimicarb o Acetamiprid o Imidacloprid o Thiametoxam) **addizionato di un fungicida** (a base di Thiram).

Avvertenze: In corsivo sono riportati i principi attivi autorizzati in agricoltura biologica
Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni riportate in etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i divieti e le limitazioni. Si ricorda che prima di eseguire qualsiasi trattamento è necessario sfalciare il cotico se vi è presenza di fioriture. **SC**

Prossimo bollettino: 21 aprile