

**BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA**  
**N. 7 DEL 12 MAGGIO 2017**

**CILIEGIO**  
**PEDEMONTANA e BERICI**

**PREVISIONI**

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV  
aggiornato al 12  
maggio h 9.00

Vicenza e pedemontana	giovedì 11 pom/sera	venerdì 12 mattina	venerdì 12 pom/sera	sabato 13 mattina	sabato 13 pom/sera	domenica 14	lunedì 15
stato del cielo							
temperatura	max 18/20 °C	min 12/14 °C max 20/22 °C		min 11/13 °C max 22/24 °C			
precipitazioni	Pioggia	Qualche pioggia	Qualche pioggia anche a carattere di rovescio	Qualche pioggia	Qualche pioggia	Qualche pioggia anche a carattere di rovescio/temporale	Qualche pioggia anche a carattere di rovescio/temporale
probabilità precipitazioni	60%	30%	40%	10%	20%	60%	30%
attendibilità previsione		Discreta	Discreta	Discreta	Discreta	Discreta	Discreta

**Andamento meteo:** Anche quest'ultima settimana è stata connotata da tempo instabile e freddo. Per 6 giorni su 7 si sono succeduti vari eventi piovosi, quasi tutti deboli, che hanno portato complessivamente 25-30 mm. in tutto il territorio. Le temperature hanno segnato un rialzo rispetto alla settimana precedente ma sono state ancora inferiori alla norma del periodo di ben 4°C sui valori massimi e di 1,5-2°C su quelli minimi attestandosi rispettivamente e mediamente sui 18-19°C e 10-11°C. Non si sono verificati eventi calamitosi.

**Stato fenologico e culturale:** Inviaitura avanzata delle Bigarreau in entrambi i comprensori e primo inizio di colorazione sulle varietà a maturazione intermedia (Gracestar ecc.).

La progressione di fase, da 20 gg a questa parte, è avanzata a ritmo lento ed è perciò prevedibile una certa accelerazione delle maturazioni appena ci sarà un rialzo delle temperature. In alcune situazioni la forte scalarità di sviluppo sulle cv. precoci, già evidente all'allegagione, si è ulteriormente ampliata.

**In questo fine settimana inizieranno ovunque le raccolte**, dopo le "spigolature" dei giorni scorsi nelle situazioni più avvantaggiate.

**Stato parassitario:** **Monilia** – al momento le presenze sono ancora assai limitate e relegate quasi esclusivamente negli impianti poco curati con notevole presenza di mummie dell'anno precedente. Scarsa presenza anche sui frutti spaccati laddove sono stati fatti correttamente gli interventi consigliati. **Drososila** – **Le catture rilevate nelle trappole Drosotrap** (attivate con sostanza a base di aceto di mele, vino rosso e zucchero) **sono molto basse ovunque**. Anche la presenza di fori da ovodeposizione è attualmente minima (1% dei frutti esaminati). **Cimice asiatica** – negli impianti, le presenze dell'insetto sono del tutto occasionali in entrambi i comprensori.

**Indirizzi di difesa:** **Per le varietà precoci in via di raccolta non c'è alcuna necessità, in generale.** E' consigliato intervenire con prodotti antimonilia specifici con 3 giorni di carenza, solo nel caso di prolungate bagnature. **Per le varietà medio-tardive, invece, è ormai giunto o è prossimo il momento di mettere in essere la strategia di lotta contro la Drososila suzukii e la Mosca** (vedere criteri e dettagli nell'allegato "ProvVI\_strategia\_Dsuzukii") affiancando un antimonilia a necessità, come detto sopra. Gli insetticidi da impiegare contro Drososila/Mosca sono efficaci anche contro la Cimice asiatica.

**Avvertenze:** Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni riportate in etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i divieti e le limitazioni d'uso. **SC**



Stadio cv. Bigarreau



Stadio cv. Ferrovia



Monilia su frutto



trappola D. suzukii



Catture in una Drosotrap



Cimice asiatica