

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 15 DEL 6 LUGLIO 2018

OLIVO

PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI
prossimi 5 gg.

Vicenza e pedemontana	venerdì 6 pom/sera	sabato 7 mattina	sabato 7 pom/sera	domenica 8 mattina	domenica 8 pom/sera	lunedì 9	martedì 10
stato del cielo							
temperatura	max 26/28 °C	min 17/19 °C max 29/31 °C		min 18/20 °C max 29/31 °C			
precipitazioni	Locali anche a carattere di rovescio/temporale	Assenti	Generalmente assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Qualche pioggia verso sera
probabilità precipitazioni	40%	0%	10%	0%	0%	0%	10%
attendibilità previsione		Discreta	Discreta	Buona	Buona	Buona	Discreta

Bollettino ARPAV
06/07 h 13.00

Andamento meteo: Dopo un fine settimana propriamente estivo è sopraggiunta una nuova fase di instabilità che ha prodotto dei temporali anche molto violenti, ma più a nord della nostra Provincia. Tranne il Bassanese nel quale sono caduti nel complesso una decina di mm, in tutto il resto del territorio le piogge si sono limitate al massimo ad un paio di mm. Le temperature massime, dopo aver superato i 32-33°C sabato u.s. sono scese di qualche grado per poi ritornare sopra i 30° nella giornata di mercoledì. Quelle minime, invece, sono oscillate di meno e si collocano attualmente sui 18,5-20°C. Questi valori risultano in linea con la media del periodo 1992/2017 per le massime mentre risultano superiori di 0,5-1°C per le minime.

Stato fenologico e colturale: Prosegue attivamente la fase di ingrossamento delle drupe le quali hanno raggiunto dimensioni su Leccino di 1,2-1,7 cm in bassa collina e 1-1,4 cm in alta collina. Attualmente la stagione produttiva sembra ben avviata e promettente su tutte le varietà e comprensori ad eccezione, almeno per quanto visto finora, di diverse realtà di pianura e bassa quota che risultano quasi totalmente scariche per mancata allegagione. Nella ricognizione compiuta questa settimana sono state rilevate, in quasi tutti gli impianti monitorati, delle manifestazioni di appassimento/avvizzimento/cascola di frutti già accresciuti (con dimensioni solo leggermente inferiori a quelli normali). I sintomi (in foto) sono aspecifici e molto simili a quelli già riscontrati lo scorso anno con necrosi più o meno estese e confluenti, comunque progressive, ad iniziare quasi sempre dal lato opposto del peduncolo. Il fenomeno è assai contenuto al momento ma desta viva preoccupazione in campagna dopo una prima cascola fisiologica che, qua e là, è stata più intensa della norma.


In ogni caso alcuni campioni sono stati già stati messi in coltura in laboratorio per verificare l'eventuale presenza di patogeni mentre quelli prelevati la scorsa settimana su frutti con sintomatologie simili non hanno ancora dato espressioni utili.

Si consiglia di sfalciare il cotico per ridurre la competizione idrica del prato e di iniziare a irrigare dove c'è un'ottima carica pendente, se si dispone di impianti a goccia.

Stato parassitario: *Malattie fungine e batteriche* – nessuna novità circa Occhio di Pavone e Rogna. Sono stati invece reperiti in pedemontana alcuni casi di cancri ai rami su cui si sta indagando. *Insetti* – Tignola pressochè assente, la Cimice asiatica è presente diffusamente ma non ancora in quantità elevata.

Indirizzi di difesa: Nessuna indicazione di trattamenti fitosanitari al momento.

Suggerimenti: Tenere sempre a disposizione almeno un trattamento rameico. All'evenienza di una grandinata è indispensabile intervenire rapidamente per "disinfettare" le ferite e contrastare la proliferazione del batterio della Rogna (*pseudomonas savastanoi*).. **SC e MP**



Campioni di drupe avvizzite/cascolate in coltura per verificare la presenza di patogeni (SC)

Prossimo bollettino Olivo: 13 luglio